


麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎ワクチン接種のフローチャート

2019年12月25日

獨協医科大学埼玉医療センター



注意事項

*1 接種記録や抗体価記録の提出は必要ありません。

*2 ワクチンを2回受ける時は抗体価測定を省略しても良い。

抗体価基準表（日本環境感染学会 医療関係者のためのワクチンガイドライン 第2版より引用）

疾患名	抗体価陰性	抗体価陽性 (基準を満たさない)	抗体価陽性 (基準を満たす)
麻疹	EIA法(IgG) : 陰性 あるいはPA法 : <1:16 あるいは中和法 : <1:4	EIA法(IgG) : (±) ~ 16.0 あるいはPA法 : 1:16, 32, 64, 128 あるいは中和法 : 1:4	EIA法(IgG) : 16.0以上 あるいはPA法 : 1:256以上 あるいは中和法 : 1:8以上
風疹	HI法 : <1:8 あるいはEIA法(IgG) : 陰性	HI法 : 1:8, 16 あるいはEIA法(IgG) : (±) ~ 8.0	HI法 : 1:32以上 あるいはEIA法(IgG) : 8.0以上
水痘	EIA法(IgG) : <2.0※ あるいはIAHA法 : <1:2※ あるいは中和法 : <1:2※	EIA法(IgG) : 2.0 ~ 4.0※ あるいはIAHA法 : 1:2※ あるいは中和法 : 1:2※	EIA法(IgG) : 4.0以上※ あるいはIAHA法 : 1:4以上※ あるいは中和法 : 1:4以上※ あるいは水痘抗原皮内テストで 陽性(5mm以上)
流行性 耳下腺炎	EIA法(IgG) : 陰性	EIA法(IgG) : (±)	EIA法(IgG) : 陽性