

レジメンコード 101002

レジメン名称 PAC/S-1

投与間隔 21 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 101002

レジメン名称 PAC/S-1

投与間隔 21 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポラミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 50 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	