

レジメンコード 101003

レジメン名称 S-1/CDDP

投与間隔 35 日

備考 S-1 80mg/m² day1-21

病日 8 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 4 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 全開投与 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間 - 以下余白 -	500 m L 4 m L 10 m L	