

レジメンコード 101008

レジメン名称 HXP（初回8mg/kg）

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後）K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイカ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] ハーセプチン注射用150[7.2mL/150mg/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 80 m g /m ²	

レジメンコード101008
レジメン名称 HXP（初回8mg/kg）
投与間隔 21 日
備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1夕-15朝

病日 1 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）K C L 注20mEqキット「テルモ」[1moL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	500 m L 10 m L	