

レジメンコード 101017

レジメン名称 DCS

投与間隔 28 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイリ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 35 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 35 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 101017

レジメン名称 DCS

投与間隔 28 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイリ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 35 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 35 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分	50 m L 1 管	
— 以下余白 —		