

レジメンコード 101031
 レジメン名称 FOLFOX/Nivo
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食 [100mL/袋] オプジーボ点滴静注240mg [24mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 240 m g	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ⑤ ⑥と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 85 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5% [250mL/袋] レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g / m ²	

レジメンコード 101031
 レジメン名称 FOLFOX/Nivo
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 15分	100 m L 400 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 生食はtotalで230mL、インフューサーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間 - 以下余白 -	230 m L 2400 m g / m ²	