

レジメンコード 102001

レジメン名称 IRIS

投与間隔 28 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 102001

レジメン名称 IRIS

投与間隔 28 日

備考 S-1 80mg/m² day 1-14

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 125 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	