

レジメンコード 102011  
 レジメン名称 5-FU/MMC  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	500 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] マイトマイシン注用2mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	100 m L 10 m g / m <sup>2</sup>	
— 以下余白 —		

レジメンコード 102011  
 レジメン名称 5-FU/MMC  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  — 以下余白 —	500 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 102011  
 レジメン名称 5-FU/MMC  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  — 以下余白 —	500 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 102011  
 レジメン名称 5-FU/MMC  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間  — 以下余白 —	500 m L 1000 m g / m <sup>2</sup>	