

レジメンコード 102015
 レジメン名称 FOLFIRI/AFL
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後)ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] ザルトラップ点滴静注200mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 4 m g /kg	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	50 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ⑥と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 150 m g /m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g /m ²	

レジメンコード102015
レジメン名称 FOLFIRI/AFL
投与間隔 14 日
備考

病日 1 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 15分	100 m L 400 m g /m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 46時間 — 以下余白 —	230 m L 2400 m g /m ²	