

レジメンコード102020
レジメン名称 mFOLFOXIRI
投与間隔 14 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 150 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ③ ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 85 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 生食はtotalで240mL、インフューザーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 48時間 — 以下余白 —	240 m L 2400 m g / m ²	