

レジメンコード 102101
 レジメン名称 IRIS/Bmab
 投与間隔 28 日
 備考 TS-1 80mg/m² day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）リナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード102101
レジメン名称 IRIS/Bmab
投与間隔 28 日
備考 TS-1 80mg/m² day 1夕-15朝

病日 15 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）リナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	