

レジメンコード 102103  
 レジメン名称 mFOLFOX6/Bmab  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                | <用量>                                | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」<br>アロカリス点滴静注235mg [10mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分                 | 1 袋<br>1 瓶<br>1 瓶                   |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。<br>点滴時間 1時間30分                  | 100 m L<br>5 m g /kg                |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚糖液5%[250mL/袋]<br>エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V]<br>○化学療法で実施<br>③<br>④と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間                                             | 250 m L<br>85 m g /m <sup>2</sup>   |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚糖液5%[250mL/袋]<br>レボホリナート点滴静注用100mg「NP」<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間                                              | 250 m L<br>200 m g /m <sup>2</sup>  |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>ブドウ糖注(光糖液5%) [5%100mL/B]<br>後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 15分                                          | 100 m L<br>400 m g /m <sup>2</sup>  |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>生食はtotalで230mL、インフューザーポンプ (5mL/hr)<br>点滴時間 46時間<br>— 以下余白 — | 230 m L<br>2400 m g /m <sup>2</sup> |      |