

レジメンコード102104

レジメン名称 mFOLFOX6（アレルギー）/Bmab

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶 1 管 1 管	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ③ ④と同時に投与開始 点滴時間 4時間	250 m L 85 m g /m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] レボホリナート点滴静注用100mg[NP] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 4時間	250 m L 200 m g /m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 ブドウ糖注(光糖液5%) [5%100mL/B] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 15分	100 m L 400 m g /m ²	

レジメンコード102104
レジメン名称 mFOLFOX6（アレルギー）/Bmab
投与間隔 14 日
備考

病日 1 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後)フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで220mL、インフューザーポンプ（5mL/hr） 点滴時間 44時間 — 以下余白 —	220 m L 2400 m g /m ²	