

レジメンコード102106

レジメン名称 XELOX（アレルギー）/Bmab（アロカリス）

投与間隔 21 日

備考 ゼロータ 1000mg/m²/回 day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ベバシマブ [®] BS点滴静注400mg「第一三共」[16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 7.5 m g /kg	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タケノ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 3 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エルブラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 130 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	