

レジメンコード 102112  
 レジメン名称 FOLFOXIRI/Bmab  
 投与間隔 14 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                    | <用量>                                | <メモ> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」<br>アロカリス点滴静注235mg [10mL/B]<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分                  | 1 袋<br>1 瓶<br>1 瓶                   |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。<br>点滴時間 1時間30分                      | 100 m L<br>5 m g /kg                |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚糖液5%[250mL/袋]<br>後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間                                                      | 250 m L<br>165 m g /m <sup>2</sup>  |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚糖液5%[250mL/袋]<br>エルブラット点滴静注液100mg [20mL/V]<br>○化学療法で実施<br>④<br>⑤と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間                                                 | 250 m L<br>85 m g /m <sup>2</sup>   |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚糖液5%[250mL/袋]<br>後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>側管 ④と同時に投与開始<br>点滴時間 2時間                                               | 250 m L<br>200 m g /m <sup>2</sup>  |      |
| 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>生食はtotalで240mL、インフューザーポンプ (5mL/hr)<br>点滴時間 48時間<br><br>— 以下余白 — | 240 m L<br>3200 m g /m <sup>2</sup> |      |