

レジメンコード102115  
レジメン名称 XELIRI/Bmab  
投与間隔 21 日  
備考 ゼロータ 800mg/m<sup>2</sup>/回 day 1夕-15朝

病日 1 日目 ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                                         | <用量>                               | <メモ> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 10分                                                                                | 50 m L                             |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後) ベバシマブ <sup>®</sup> BS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。<br>点滴時間 1時間30分 | 100 m L<br>7.5 m g /kg             |      |
| 点滴注射（D I V）<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイバ」<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 15分                                       | 1 袋<br>1 瓶                         |      |
| 点滴注射（D I V）<br>大塚糖液5% [250mL/袋]<br>後) リナネン塩酸塩点滴静注液100mg 「SUN」 [5mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 1時間                                               | 250 m L<br>200 m g /m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                | 50 m L                             |      |