

レジメンコード102116

レジメン名称 TAS-102/Bmab (4週)

投与間隔 28 日

備考 ロンサ-フ 70mg/m² 分2 day 1 (夕) -6 (朝)、day8 (夕) -13 (朝)

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg 「第一三共」 [4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード102116
レジメン名称 TAS-102/Bmab (4週)
投与間隔 28 日
備考 ロンサ-フ 70mg/m² 分2 day 1 (夕) -6 (朝) 、 day8 (夕) -13 (朝)

病日 15 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg 「第一三共」 [4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	