

レジメンコード102117

レジメン名称 mFOLFOXIRI/Bmab

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」[4mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 mL 5 mg/kg	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 mL 150 mg/m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] エルブラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ④ ⑤と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 mL 85 mg/m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 mL 200 mg/m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 生食はtotalで240mL、インサナーポンプ (5mL/hr) 点滴時間 48時間 - 以下余白 -	240 mL 2400 mg/m ²	