

レジメンコード102203

レジメン名称 CPT-11/Cmab (400mg/m²) (導入)

投与間隔 7 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) イリナカ塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	500 m L 150 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	