

レジメンコード102211
レジメン名称 SOX/Cmab（導入）（アロカリス）
投与間隔 28 日
備考 S-1 80mg/m² day 8夕-22朝

病日 1 日目 ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 400 m g /m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L	

レジメンコード102211
レジメン名称 SOX/Cmab（導入）（アロカリス）
投与間隔 28 日
備考 S-1 80mg/m² day 8夕-22朝

病日 8 日目 ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 130 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード102211
レジメン名称 SOX/Cmab（導入）（アロカリス）
投与間隔 28 日
備考 S-1 80mg/m² day 8夕-22朝

病日 15 日目 ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g /m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L	

レジメンコード102211
レジメン名称 SOX/Cmab（導入）（アロカリス）
投与間隔 28 日
備考 S-1 80mg/m² day 8夕-22朝

病日 22 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g /m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	100 m L	