

レジメンコード103003

レジメン名称 FP (術前)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103003
レジメン名称 FP (術前)
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード103003

レジメン名称 FP (術前)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 前日の⑦終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード103003

レジメン名称 FP (術前)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 前日の⑥終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーフ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103003
 レジメン名称 FP (術前)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 前日の⑥終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103003
 レジメン名称 FP (術前)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 前日の⑤終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 800 m g / m ²	