

レジメンコード 103006
 レジメン名称 5-FU/CDDP/RT
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	1000 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 22時間	1000 m L 700 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 2時間	500 m L 70 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤終了後投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 管	

レジメンコード103006
レジメン名称 5-FU/CDDP/RT
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目 ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧終了後投与開始 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 103006
レジメン名称 5-FU/CDDP/RT
投与間隔 28 日
備考

病日 2 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 700 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分 — 以下余白 —	1500 m L	

レジメンコード 103006
レジメン名称 5-FU/CDDP/RT
投与間隔 28 日
備考

病日 3 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 700 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分 — 以下余白 —	1500 m L	

レジメンコード 103006
 レジメン名称 5-FU/CDDP/RT
 投与間隔 28 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 700 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 23時間30分 — 以下余白 —	1500 m L	