

レジメンコード 103009

レジメン名称 5FU/KEY

投与間隔 28 日

備考 FP/KEY後、維持療法

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 200 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	1000 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103009
レジメン名称 5FU/KEY
投与間隔 28 日
備考 FP/KEY後、維持療法

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の④終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	1000 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103009
レジメン名称 5FU/KEY
投与間隔 28 日
備考 FP/KEY後、維持療法

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	1000 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103009
レジメン名称 5FU/KEY
投与間隔 28 日
備考 FP/KEY後、維持療法

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	1000 m L 800 m g / m ²	

レジメンコード 103009
 レジメン名称 5FU/KEY
 投与間隔 28 日
 備考 FP/KEY後、維持療法

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 前日の②終了後、ルート交換 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋] 後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 24時間	1000 m L 800 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ ②終了後フラッシュ用 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	