

レジメンコード 104004

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1moL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 4 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	250 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	250 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1moL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間 - 以下余白 -	500 m L 4 m L 10 m L	

レジメンコード 104004

レジメン名称 GC

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1moL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 4 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	250 m L 1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	250 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] K C L注20mEqキット「テルモ」[1moL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	500 m L 4 m L 10 m L	