

レジメンコード104007  
レジメン名称 GEM/S-1（膀胱癌）  
投与間隔 21 日  
備考 S-1：80mg/m<sup>2</sup>/day day1-14

病日 1 日目 ページ数：1/2

| <薬品名・用法>                                                                                                | <用量>                                 | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1 瓶                           |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                     | 100 m L<br>1000 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                        | 50 m L                               |      |

レジメンコード104007  
レジメン名称 GEM/S-1（膀胱癌）  
投与間隔 21 日  
備考 S-1：80mg/m<sup>2</sup>/day day1-14

病日 8 日目 ページ数：2/2

| <薬品名・用法>                                                                                                | <用量>                                 | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1 瓶                           |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                     | 100 m L<br>1000 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                        | 50 m L                               |      |