

レジメンコード104012

レジメン名称 Dur v alumab/GC

投与間隔 21 日

備考 8コース 体重30kg以下の場合Durvalumab：20mg/kg

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] イミフィンジ点滴静注500mg[10mL/瓶] 最大量超過認識済み(体重) ○化学療法で実施 体重30kg以下の場合20mg/kg ② 点滴時間 1時間	250 m L 1500 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	

レジメンコード104012
レジメン名称 Dur v alumab/GC
投与間隔 21 日
備考 8コース 体重30kg以下の場合Durvalumab：20mg/kg

病日 1 日目 ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑤終了後投与開始 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑦終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨終了後投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード104012

レジメン名称 Dur v alumab/GC

投与間隔 21 日

備考 8コース 体重30kg以下の場合Durvalumab：20mg/kg

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 1時間	250 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	

レジメンコード104012
レジメン名称 Dur v alumab/GC
投与間隔 21 日
備考 8コース 体重30kg以下の場合Durvalumab：20mg/kg

病日 8 日目 ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥終了後投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	