

レジメンコード 230006
 レジメン名称 CBDCA/VP-16
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 1時間30分 ④ — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 230006
 レジメン名称 CBDCA/VP-16
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 1時間30分 ③ — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 230006
 レジメン名称 CBDCA/VP-16
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間 1時間30分 ③ — 以下余白 —	500 m L	