

レジメンコード 230027
 レジメン名称 weekly PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230027
 レジメン名称 weekly PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 230027
 レジメン名称 weekly PAC
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ`1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	