

レジメンコード230043

レジメン名称 リツキサン（尋常性天疱瘡）

投与間隔 28 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 mL 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ※リツキサン点滴静注500mg[50mL/B] ○化学療法で実施 ② ！！■ 2mg/mL となるように生食で希釈 ■！！ = 1000mg/body 全量500mL 【 2mg/mL 】 = ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 25mL/hr 30～60分 50mL/hr 60～90分 75mL/hr 90～120分 100mL/hr 120～150分 125mL/hr 150～180分 150mL/hr 180～210分 175mL/hr 210分以降 200mL/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90分以降 200mL/hr	400 mL 1000 mg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	

レジメンコード230043

レジメン名称 リツキサン（尋常性天疱瘡）

投与間隔 28 日

備考 R投与前に抗ヒ剤/NSAIDs内服

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 mL 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] ※リツキサン点滴静注500mg[50mL/B] ○化学療法で実施 ② ！！■ 2mg/mL となるように生食で希釈 ■！！ = 1000mg/body 全量500mL 【 2mg/mL 】 = ■■投与法（初回投与時）■■ 00～30分 25mL/hr 30～60分 50mL/hr 60～90分 75mL/hr 90～120分 100mL/hr 120～150分 125mL/hr 150～180分 150mL/hr 180～210分 175mL/hr 210分以降 200mL/hr ■■投与法（2回目以降の投与時）■■ 00～30分 50mL/hr 30～60分 100mL/hr 60～90分 150mL/hr 90分以降 200mL/hr	400 mL 1000 mg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 mL	