

レジメンコード 201002
 レジメン名称 G-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 0 m g / A	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 201002
レジメン名称 G-CBDCA
投与間隔 21 日
備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バ ^ッ グ ^ッ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	1 袋	