レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg [NK] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 25 m g	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ④投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	250 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 管	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑫と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑮ 点滴時間 10時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロプレドール注射液10mg [タカタ] [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロプレチド注射液10mg [タカタ] [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	250 m L 750 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロプラミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 2 管 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] 後) 塩酸トクロプラミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 2 管 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L	

レジメンコード 201005

レジメン名称 IFAP

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	