

レジメンコード201007

レジメン名称 TIN（尿路上皮癌）

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 3 瓶 1 管 1 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 175 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] アクブラ静注用50mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 70 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 201007
 レジメン名称 TIN (尿路上皮癌)
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ² 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦開始と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑦開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑦開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分 - 以下余白 -	50 m L 300 m g / m ²	

レジメンコード 201007

レジメン名称 TIN (尿路上皮癌)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセットF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③開始と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセットF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 201007

レジメン名称 TIN (尿路上皮癌)

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード201007

レジメン名称 TIN (尿路上皮癌)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 1 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセットF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③開始と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセットF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード201007

レジメン名称 TIN (尿路上皮癌)

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/6

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 300 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	