

レジメンコード 201008
 レジメン名称 VP-16/CBDCA（小細胞癌）
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトキシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	250 m L 0 m g / A	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201008
 レジメン名称 VP-16/CBDCA（小細胞癌）
 投与間隔 28 日
 備考 AUC 5

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 201008

レジメン名称 VP-16/CBDCA（小細胞癌）

投与間隔 28 日

備考 AUC 5

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	