

レジメンコード 201011
 レジメン名称 CDDP動注/放射線療法
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] メイロン注[7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ソル・メドロール静注用125mg 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1 瓶 1 管	
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始	100 m g	
点滴注射 (D I V) デトキシソール静注液2g[20mL/B] 大塚生食注[250mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 シスプラチン10mgあたりデトキシソール2gを同時投与 生理食塩水を200mL抜き、デトキシソールを注入 全開投与 点滴時間 15分	10 瓶 50 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン注[7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 201011
 レジメン名称 CDDP動注/放射線療法
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 14時間	500 m L	
— 以下余白 —		