

レジメンコード201012
レジメン名称 GC 3week (ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 201012

レジメン名称 GC 3week (ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液[500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイバ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 70 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード201012
レジメン名称 GC 3week (ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)
投与間隔 21 日
備考

病日 8 日目 ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	