

レジメンコード201013
レジメン名称 G-CBDCA (ショートハイﾄﾞﾚｰｼｮﾝ)
投与間隔 21 日
備考 AUC 5

病日 1 日目 ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[200mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	200 m L	

レジメンコード 201013
レジメン名称 G-CBDCA（ショートハイットレション）
投与間隔 21 日
備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	