

レジメンコード 201016
 レジメン名称 パドセブ
 投与間隔 28 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] パドセブ点滴静注用30mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルを注射用水3.3mLで溶解 (10mg/mL) 希釈後の濃度は0.3~4.0mg/mL とすること パドセブ15mg以下の場合、0.3mg/mLに希釈 点滴時間 30分	50 m L 1.25 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 201016
 レジメン名称 パドセブ
 投与間隔 28 日
 備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] パドセブ点滴静注用30mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルを注射用水3.3mLで溶解 (10mg/mL) 希釈後の濃度は0.3~4.0mg/mL とすること パドセブ15mg以下の場合、0.3mg/mLに希釈 点滴時間 30分	50 m L 1.25 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 201016
 レジメン名称 パドセブ
 投与間隔 28 日
 備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] パドセブ点滴静注用30mg ○化学療法で実施 ② 1バイアルを注射用水3.3mLで溶解 (10mg/mL) 希釈後の濃度は0.3~4.0mg/mL とすること パドセブ15mg以下の場合、0.3mg/mLに希釈 点滴時間 30分	50 m L 1.25 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	