

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 側管 ②投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロピラミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 8時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカ」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカ」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：7/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	300 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 8時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 9 日目

ページ数：8/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g	
— 以下余白 —		

レジメンコード 203001

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 16 日目

ページ数：9/9

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g	
— 以下余白 —		