レジメンコード 203002
 レジメン名称 E-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 1.5

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 203002
 レジメン名称 E-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 1.5

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 203002
 レジメン名称 E-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 1.5

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハッグ} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 203002
 レジメン名称 E-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 1.5

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 203002
 レジメン名称 E-CBDCA
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 1.5

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	