

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g /m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 203003

レジメン名称 EP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	