

レジメンコード 203004

レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 2.5 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] 後）塩酸マクロプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10時間30分 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203004
 レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 側管 ②投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋 0.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] アクブラ静注用50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	

レジメンコード 203004
 レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
 投与間隔 28 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ④開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ヘパロックヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL ○化学療法で実施 ⑨ ヘパリンロック用 — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 203004

レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 0.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	

レジメンコード 203004
レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
投与間隔 28 日
備考

病日 3 日目 ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ヘパロックヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL ○化学療法で実施 ⑦ ヘパリンロック用 ー 以下余白 ー	1 筒	

レジメンコード 203004

レジメン名称 TIN (精巣腫瘍)

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 0.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	

レジメンコード 203004
レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
投与間隔 28 日
備考

病日 4 日目 ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL ○化学療法で実施 ⑦ ヘパリンロック用 — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 203004

レジメン名称 TIN (精巣腫瘍)

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 0.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	

レジメンコード 203004
レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
投与間隔 28 日
備考

病日 5 日目 ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ヘパロックヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL ○化学療法で実施 ⑦ ヘパリンロック用 — 以下余白 —	1 筒	

レジメンコード 203004

レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 0.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	

レジメンコード 203004
レジメン名称 TIN（精巣腫瘍）
投与間隔 28 日
備考

病日 6 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ヘパリンロック用10単位/mLシリンジ 10mL ○化学療法で実施 ⑦ ヘパリンロック用 — 以下余白 —	1 筒	