

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム)[7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③投与開始30分前に全開投与 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 ⑧と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑪と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 3時間	500 m L	

レジメンコード 203005
レジメン名称 VIP
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） K N 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 203005

レジメン名称 VIP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液 [500mL/袋] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 240 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 6時間	500 m L	
— 以下余白 —		