

レジメンコード 204003  
 レジメン名称 Cabazitaxel  
 投与間隔 21 日  
 備考 PSL 10mg/day 連日投与

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                         | <用量>                               | <メモ> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後）ファモチジン注射用20mg「サワイ」<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分                                | 100 m L<br>1 瓶<br>1 管<br>1 管       |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                                                                                                       | 100 m L                            |      |
| 点滴注射（D I V）<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>ジェブタナ点滴静注60mg[1.5mL/B]<br>■希釈後の最終濃度は0.10～0.26mg/mL<br>■JET<25mg：輸液バック100mL<br>■JET>65mg：輸液バック500mL<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間 | 250 m L<br>25 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 5分<br><br>— 以下余白 —                                                                                  | 50 m L                             |      |