

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①投与1時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイタ」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②投与終了後、投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L 175 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 側管 ⑥開始4時間後に投与開始 ⑨ 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L 1 管	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管 ⑥開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1.2 g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 400 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ③開始4時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	150 m L	

レジメンコード 205001

レジメン名称 TIP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 25 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	150 m L	
点滴注射（D I V） ソルアセトD輸液[500mL/袋] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 40 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ③開始8時間後に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 200 m g / m ²	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） アクチット輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 10時間 — 以下余白 —	500 m L	