

レジメンコード 207003
 レジメン名称 ヨンデリス
 投与間隔 21 日
 備考 Day3にDEX8mg内服

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	1 袋 2.5 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [500mL/B] ヨンデリス点滴静注用1m g ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 24時間 — 以下余白 —	500 m L 1.2 m g / m ²	

レジメンコード 207003
レジメン名称 ヨンデリス
投与間隔 21 日
備考 Day3にDEX8mg内服

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 1 瓶	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	