

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始90分後より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ①終了後開始 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ ③終了後開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ ⑤終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑦終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始60分後より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	50 m L 30 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後 フラッシュ用 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ①終了後開始 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ ⑤終了後開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセットF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ ⑦終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ ⑧終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ ⑨終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始90分後より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ①終了後開始 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ ③終了後開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ ⑤終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑦終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始90分後より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ①終了後開始 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ ③終了後開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ ⑤終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑦終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始90分後より開始 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ③ ①終了後開始 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「NIG」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ ③終了後開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ ⑤終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ ⑦終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 9 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] プレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 30 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 020011

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 16 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] プレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 30 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	