レジメンコード021203

レジメン名称 CDDP/DOC (ショートハイト レーション)

投与間隔 21 日

備考

DEX 8mg day2-3 朝・昼食後内服

病日 1 日目

ページ数: 1/1

		ペーン数:1/1
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ> 
点滴注射(DIV) KN3号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射(DIV) 大塚生食注[250mL/袋] 後)ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 60 m g/m²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニットール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射(DIV) 大塚生食注[250mL/袋] 後)シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g/m²	
点滴注射(DIV) KN3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間 - 以下余白 -	500 m L	