

レジメンコード 021301
 レジメン名称 CBDCA/GEM (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	100 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 021301
 レジメン名称 CBDCA/GEM (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 5

病日 8 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分 — 以下余白 —	100 m L	