

レジメンコード 021305

レジメン名称 necitumumab/CDDP/GEM (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 4～6コース DEX 8mg day2-3 朝・昼食後内服

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ポートラザ点滴静注液800m g [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ■■全量250mLとする■■ 点滴時間 1時間	250 m L 800 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 30分	100 m L 1250 m g / m ²	

レジメンコード021305
レジメン名称 necitumumab/CDDP/GEM (アロカリス)
投与間隔 21 日
備考 4～6コース DEX 8mg day2-3 朝・昼食後内服

病日 1 日目 ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射（D I V） K N 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 021305

レジメン名称 necitumumab/CDDP/GEM (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 4～6コース DEX 8mg day2-3 朝・昼食後内服

病日 8 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] ポートラザ点滴静注液800m g [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ② ■■全量250mLとする■■ 点滴時間 1時間	250 m L 800 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	100 m L 1250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	