

レジメンコード023004

レジメン名称 CDDP/PEM/KEY (ショートハイドレーション)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タレウ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 200 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ペメトレキセド点滴静注液800mg 「NK」 [32mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	100 m L 500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 8 m L	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 75 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) K C L 注20mEqキット「テルモ」[1mL/20mL/筒] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	500 m L 10 m L	